

Factores Psicosociales y Obstétricos asociados con Depresión, Ansiedad o Estrés Psicológico en embarazadas residentes en el caribe colombiano

González-Sequeda Andrea, Monterrosa-Castro Álvaro, Salazar-Trujillo Andrea

Grupo de Investigación Salud de la Mujer – Facultad de Medicina Universidad de Cartagena Cartagena – Colombia



Universidad de Cartagena Fundada en 1827

INTRODUCCION

La gestación es un proceso natural que además de los componentes obstétricos, implica la adaptación espontanea de la mujer a distintas exigencias biopsicosociales relacionadas con el embarazo. La Depresión, Ansiedad e incluso el Estrés Psicológico Percibido, pueden estar relacionados con eventos adversos maternos, perinatales y neonatales.

Son insuficientes los estudios que exploran las dimensiones de la salud mental en gestantes del caribe colombiano.

OBJETIVO

Determinar la frecuencia de Depresión, Ansiedad y Estrés Psicológico Percibido, así como su asociación con factores psicosociales y obstétricos en gestantes que acuden a consulta de evaluación prenatal.

METODOLOGIA

Estudio transversal que hace parte del proyecto "Salud biopsicosocial en embarazadas de bajo riesgo atendidas en la consulta prenatal". Participación anónima y voluntaria. Aprobado por el comité de ética de la Clínica Santa Cruz de Bocagrande. Cartagena. Se estudiaron gestantes residentes en área rural o urbana del Departamento de Bolívar.

Asistieron a consulta ambulatoria de control prenatal.

Se utilizó un formulario que exploraba características sociodemográficas y condiciones obstétricas. Se aplicó la Escala *Depression, Anxiety and Stress* (DASS-21). Análisis con Stata IC16. Se realizó Regresión Logística Ajustada. Depresión, Ansiedad o Estrés (variable dependiente). Factores psicosociales y obstétricos (variables independientes).

RESULTADOS


Comparación según Factores Psicosociales y Obstétricos

n = 509 Gestantes, n (%)						
Adolescentes (13-19 años)	64 (12.5)					
Adultas (20-42 años)	445 (87.4)					
Estar unidas (casadas-unión libre)	451 (88.6)					
Soltera	58 (11.3)					
Creyente y practicante religión	233 (45.7)					
Ama de casa	256 (50.2)					
Urbana	326 (64.0)					
Rural	183 (35.9)					
Preocupación con el embarazo	145 (28.4)					
Angustia durante el embarazo	111 (21.8)					
Problemas conyugales	43 (8.4)					
Problemas económicos	111 (21.8)					
Primigestantes	210 (41.2)					
Dos o más gestaciones	299 (58.7)					
Una o más cesáreas	156 (30.6)					
Diabetes Gestacional	43 (8.4)					
Anemia Gestacional	67 (13.1)					
Infección Urinaria en el embarazo	150 (29.4)					
Sobrepeso / Obesidad en embarazo	226 (44.4)					

Frecuencia porcentual [DASS-21]								
	Presencia	Leve o moderada	Severa o extremadamente severa					
Depresión	26.9	19.0	7.8					
Ansiedad	37.5	18.2	19.2					
Estrés	23.1	15.7	7.4					

Depresión, Ansiedad, Estrés

Comparación			310030	Clare	es y C	DSIGN	1003
		Depresión		Ansiedad		Estrés	
		(%)	р	(%)	р	(%)	р
Grupos	Adolescentes	59.3	<0.001	64.0	<0.001	34.3	<0.05
Etarios	Adultas	22.2	<0.001	33.7	\0.001	21.5	<0.05
Estado	Solteras	46.5	40.004	48.2	0.07	32.7	0.00
Civil	Estar unidas	24.3	<0.001	36.1	0.07	21.9	0.06
Doligión	No practicante	24.3	<0.001	43.4	<0.001	26.8	<0.05
Religión	Practicante	18.8	\0.001	30.4	~0.001	18.8	<0.05
Ocupación	Ama de casa	33.9	<0.001	42.9	<0.05	26.5	0.06
	Profesión	19.7		32.0		19.7	
Residencia	Urbana	15.6	<0.001	29.1	<0.001	19.0	<0.001
Residencia	Rural	46.9	\0.001	52.4	\0.001	30.6	~0.001
Gravidez	Primigestante	29.5	0.26	43.3		27.1	0.07
	Dos o más	25.0	0.20	33.4	10.00	20.4	0.07
Partos	Ninguno	25.6	0.29	37.7	0.87	22.3	0.46
Vaginales	Uno o más	30.1	J. 2	36.9		25.3	
Abortos	Ninguno	27.5	0.51	38.4	0.39	23.6	0.58
	Uno o más	24.2		33.6		21.0	
Cesáreas	Ninguna	29.4	0.05	42.2	0.001	26.3	<0.05
T	Una o más	21.1		26.9		16.0	
Trimestre	Primero	15.3	0.40	30.7	0.07	23.0	0.74
del	Segundo	30.3	0.12	42.9	0.07	24.8	0.71
Embarazo	Tercero	25.7		33.7		21.6	
Estado	Infra peso	37.3	-	46.4		24.2	0.53
Nutricional	Normal	30.4 17.7	<0.05	39.1 31.8	0.10	26.0 19.2	
Gestacional	Sobrepeso Obesidad	21.9		32.9		21.9	
Angustiada	No	19.8		30.4		18.5	
con Embarazo	Si	52.2	<0.001	63.0	<0.001	39.6	<0.001
Preocupación	No	21.7		31.5		14.8	
con Embarazo	Si	40.0	<0.001	52.4	<0.001	44.1	<0.001
Problemas	No	24.0		34.7		20.3	
Conyugales	Si	58.1	<0.001	67.4	<0.001	53.4	<0.001
Problemas	No	19.8		32.4		17.4	.0.004
Económicos	Si	45.0	<0.001	50.7	<0.001	38.0	<0.001
Consumo de	No	22.8		34.2		21.4	
Café diario en			<0.001		<0.05		0.13
embarazo	Si	37.5		46.1		27.6	
Hipertensión	No	25.9	0.010	36.5	<0.05	22.2	<0.05
Arterial	Si	52.6	0.010	63.1	~ 0.05	47.3	~0.05
Diabetes	No	26.9	0.87	37.4	0.76	23.3	0.58
Mellitus	Si	25.0	0.07	41.6	0.70	16.6	0.50
Asma	No	26.6	0.55	36.5	0.05	22.3	<0.05
Bronquial	Si	32.0	0.00	56.0	0.00	40.0	10100
Hipotiroidismo	No	26.7	0.75	37.2	0.48	23.3	0.73
-	Si	30.0		45.0		20.0	3.70
Diabetes	No O:	28.1	<0.05	37.9	0.48	23.3	0.71
Gestacional	Si	13.9	3.33	32.5		20.9	
Anemia	No C:	25.3	<0.05	35.7	<0.05	21.9	0.08
Gestacional	Si	37.3		49.2		31.3	
Infección	No S:	24.2	<0.05	34.5	<0.05	21.7	0.22
Urinaria	Si	33.3		44.6		26.6	



enfermedades consideradas, no fueron factores asociados

con Depresión, Ansiedad o Estrés Psicológico (P>0.05)

CONCLUSIÓN

Tres de cada diez gestantes presentaron Depresión, Ansiedad o Estrés Psicológico.

Varios factores psicosociales se asociaron significativamente.

Se sugiere explorar aspectos sociales y afectivos en las gestantes al realizar el control prenatal para adelantar la oportuna y suficiente intervención